



HELICOBACTER PYLORI V BLATU

PF-SOP-007-P-2 NAVODILA PACIENTOM ZA PRIPRAVO NA ANALIZO HELICOBACTER PYLORI V BLATU

Na rezultate testa (lažno negativen rezultat) vplivajo zdravila, zato 14 dni pred testiranjem ne uživajte antibiotikov, zaviralcev protonske črpalke (sredstva proti želodčni kislini) in bizmutovih pripravkov.

V laboratoriju predhodno dobite posodice za blato z žličko in potrebna navodila. V primeru, da ste prejeli tudi nalepke, jih prinesite s sabo in jih ne lepите na posodico z vzorcem. Če nalepk še nimate, se vpišite v pisarni, ko prinesete vzorec.

NAVODILO ZA zbiranje vzorca blata za analizo H.Pylori

Za analizo HP potrebujemo le en vzorec. Vzorec dostavite v laboratorij **čim prej** po iztrebljanju, vmesni čas ga hranite v hladilniku.

Blato zajamete z žličko iz različnih delov in ga zaprete v posodico. Količina blata, ki jo potrebujemo za analizo je velikost lešnika. Vzorec blata ne sme priti v stik z vodo v straniščni školjki.

Vzorci tekočega blata za analizo niso primerni.