



PRISOTNOST PODANČIC

PF-SOP-004-P-2 NAVODILA PACIENTOM ZA PRIPRAVO NA ANALIZO PREGLED PERIANALNEGA CELOFANSKEGA BRISA NA JAJČECA PODANČIČ (OXYURIS)

Jajčeca podančič (*Enterobius vermicularis/Oxyuris vermicularis*) dokazujemo s perianalnim celofanskim brisom, saj se jajčeca parazita ne izločajo z blatom. Samica parazita leže jajčeca v toplo in vlažno kožo perianalnih gub, kar povzroča srbenje. Odlaganje jajčec se običajno dogaja ponoči. JAJČECA SE PRILEPIJO NA KOŽO OKOLI ZADNJIKA. Dokažemo jih s pomočjo celofanskega brisa z lepilnim trakom (selotejp) perianalnega področja.

ODVZEM brisa anusa

- V laboratoriju ste prejeli navodila skupaj z objektnim stekelcem. Za izvedbo brisa potrebujete še **PROZOREN** lepilni trak (selotejp).
- Zvečer ritko umijete in osušite. Kože ritke ne namažete s kremo.
- Bris odvzamete **zjutraj, pred uriniranjem ali iztrebljanjem in brez predhodnega umivanja.**
- Odrežete trak seloteja v dolžini stekelca, odmaknete ritnici in ga z lepljivo stranjo pritisnute na anus in kožo okrog anusa.
- Trak nalepite na objektno stekelce tako, da je med površino predmetnega stekelca in seloteja čim manj mehurčkov zraka.
- Pri pravilnem odvzemu bomo videli na stekelcu odtis anusa v obliki rozete.



- Paziti moramo, da se stekelce ne razbijajo ali selotejp ne zmečka.
- Objektno stekelce položite v kuverto in ga še isti dan, čim prej, dostavite v laboratorij. Na kuverto napišite ime, priimek in rojstne podatke.