



PRISOTNOST JAJČEC PARAZITOV
PF-SOP-003-P-2 NAVODILA PACIENTOM ZA PRIPRAVO NA ANALIZO
PRISOTNOST JAJČEC PARAZITOV

Preiskovanec vsaj 7 dni pred oddajo vzorca blata ne sme uživati odvajal ali sredstev proti driski, antibiotikov in antimalarikov, saj navedena sredstva spremenijo mikrofloro črevesja. Zdravnik vam bo naročil pregled od enega do treh vzorcev blata.

V laboratoriju predhodno dobite posodice za blato z žličko in potrebna navodila. V primeru, da ste prejeli tudi nalepke, jih prinesite s sabo in jih ne lepite na posodico z vzorcem. Če nalepk še nimate, se vpišite v pisarni, ko prinesete prvi vzorec.

NAVODILO za zbiranje TREH VZORCEV blata za analizo PRISOTNOST JAJČEC PARAZITOV

Blato zajamete z žličko iz različnih delov in ga zaprete v posodico. Količina blata, ki jo potrebujemo za analizo je velikost lešnika. Vzorec blata ne sme priti v stik z vodo v straniščni školjki.

V analizo je potrebno prinesiti **vsak vzorec posebej**. Vzorec dostavite v laboratorij **čim prej** po iztrebljanju. Vzorcji tekočega blata za analizo niso primerni.

Priporoča se **odvzem treh vzorcev blata v 10-ih dneh** (odvzem vsak drugi dan). Odvzem **več vzorcev blata v istem dnevu** je NEUSTREZEN, prav tako je NEUSTREZEN tudi odvzem **treh vzorcev v treh zaporednih dneh**.